



عنوان فرایند	فرایند مدیریت مواجهات شغلی
روش نظارت	مشاهده
دامنه کاربرد	بخش ها
کد فرایند	Sh/fi/۱۲/۳
مسئول فرایند	کارشناس کنترل عفونت
تاریخ آخرین بازنگری	فروردین ۱۴۰۴
شماره بازنگری	۵
تاریخ آخرین ابلاغ	اردیبهشت ۱۴۰۴
منابع	دستورالعمل مدیریت مواجهات شغلی ویرایش ششم

اقدامات بعد از مواجهه شغلی

در صورت پاشیدن ترشحات آلوده بیمار (خون و مایع آمنیوتیک، مایع پریکارد، مایع صفاقی، مایع پلور، مایع سینوویال، مایع نخاعی) به چشم و دهان و پوست ناسالم کادر درمان یا آسیب با اشیاء تیز و برنده آلوده به ترشحات مذکور باید اقدامات زیر انجام شود.

۱. شستن محل آسیب دیده با آب و صابون و عدم فشردن ناحیه آسیب دیده، مخاط ها (چشم و دهان) در صورت پاشیده شدن ترشحات آلوده فقط با آب فراوان شسته شود. ۲. گزارش به سوپروایزر کشیک

۳. تکمیل فرم الکترونیکی: ورود به سایت دانشگاه <http://ssu.ac.ir> بالای صفحه قسمت مراکز درمانی باید بیمارستان شهید صدوقی انتخاب بعد از باز شدن سایت بیمارستان شهید صدوقی پایین صفحه اصلی قسمت فرم ها کلیک و فرم مواجهات باز و تکمیل نماید.

۴. ارسال نمونه HIV Ab، HCV Ab از بیمار در صورت پایین بودن تیتراژ HBS
پرسنل کمتر از ۱۰ از بیمار HBS Ag نیز چک شود

نتیجه آزمایش بیمار منفی

HBS مثبت

نتیجه آزمایش بیمار مثبت

HIV مثبت

HCV مثبت

HCV Ab پایه و ۶ ماه بعد
تماس در فرد مواجهه یافته
چک شود

آیا HCV
منفی است

بله خیر

شروع
دارو

اقدامی
لازم
نیست

فرد مواجهه یافته سابقه
ابتلاء به هپاتیت B دارد
یا واکسیناسیون کامل
را انجام و تیتراژ بالای ۱۰

خبر

۱. چک HBSAg, Ab, HBc Ab جهت فرد مواجهه یافته

۲. تزریق ایمونوگلوبولین هپاتیت HBIG با دوز ۰.۰۶ ml/kg یا ۵۰۰ عضلانی طی ۷ روز بعد از مواجهه با داروخانه هماهنگ شود و در اورژانس تزریق شود

۳. انجام واکسیناسیون در درمانگاه نیکوپور تزریق واکسن هپاتیت B انجام میشود

۴. پیگیری: چک HBSAg, Ab, HBc Ab شش ماه بعد از تماس

۱. نمونه گیری از خودتان HIV Ag/Ab
۲. مشاوره با جناب دکتر موسوی متخصص عفونی جهت نیاز به شروع دارو پروفیلاکسی
۳. شروع داروهای آنتی ویرال (یک ساعت تا حداکثر ۷۲ ساعت بعد مواجهه) دوز اول در داروخانه بیمارستان موجود است
۴. جهت دریافت دوزهای بعدی دارو و سایر پیگیری ها در ساعات اداری مراجعه به کلینیک بیماری های رفتاری (شماره تماس ۳۶۲۸۶۱۳۱) ساعات غیر اداری مراجعه به مرکز بهداشت تلفن: ۳۶۲۳۲۳۳۱
۵. پیگیری: در صورتیکه از تست سریع یا الیزا نسل ۳ و ۴ استفاده شود HIV Ag/Ab هفته ششم و ۳ ماه بعد از تماس چک شود
۶. در صورت عفونت همزمان HIV و HCV توصیه به تکرار HIV Ab سه ماه بعد
۷. در صورت مثبت بودن HBSAg شش ماه بعد تکرار HIV Ab

در صورت مواجهه با بیمار مبتلا به ایدز جهت شروع دوز اول داروی پروفیلاکسی با جناب آقای دکتر موسوی متخصص عفونی تماس گرفته شود
در صورت نامشخص بودن بیمار و سایر پیگیری ها با سوپروایزر کنترل عفونت فقط در ساعات اداری تماس گرفته شود